

## FOLIRON-12

(Syrup)



### COMPOSITION:

Each 5 ml Syrup contains:

Ferric Ammonium Citrate	200 mg
Vitamin B12	50 mcg
Folic Acid	1.5 mg

### PROPERTIES:

FOLIRON-12 provides an ideal preparation for the treatment of all iron and folic acid and Vit B12 deficiencies due to its good composition and excellent tolerability, and rarely cause staining teeth if the dosage is diluted or by brushing teeth after each use.

So FOLIRON-12 used effectively to treat iron anemia and Vit B12 and folic acid anemia in all age groups.

### INDICATIONS:

- To treat and prevent iron deficiency anemia especially in reduced dietary intake, pregnancy, lactation, severe menstrual bleeding, after surgical operations, infants and growth periods.

- Anemia caused by folic acid and Vit B12 deficiency.

### CONTRAINDICATIONS:

Hemolytic anemia to any cause, iron overload (hemosiderosis) hypersensitivity to any of its components.

### SIDE EFFECTS:

Iron preparation may cause nausea, vomiting, diarrhea. Which disappear when using the preparation with food or discontinue it. The feces may be colored black.

### WARNING:

Should be used in caution in case of ulcers (Gastric and intestinal).

### DRUG INTERACTION:

It should not be given with tetracycline or antacids.

### DOSAGE & ADMINISTRATION:

As doctor prescribed and according to the patient case.

It is better to be taken while eating or after meals.

- Infants:	2.5 ml	1-3 times daily.
- Children:	5 ml	1-3 times daily.
- Adults:	10 ml	1-3 times daily.

### PACKAGE:

Carton box of 125 ml glass bottle.

Carton box of 200 ml glass bottle.

### STORAGE:

Store between 15-25°C.

PK0070/02

TPP1301462	THIS IS A MEDICAMENT
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.	
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.	
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.	
- Do not be yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.	
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.	
- Keep medicaments out of reach of children.	
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)	

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sydnaia - Damascus - Syria  
Tel.: +963 11 5955339 - Fax: +963 11 5975174  
E-mail: ultramed@scs-net.org - www.ultra-medica.net



(شرب)

## فوليرون - ١٢

### التركيب:

كل ٥ مل شرب فوليرون - ١٢ تحتوي على:  
سيترات الحديد النشاردية ٢٠٠ ملغ  
فيتامين ب١٢ ٥٠ ميكغ  
حمض الفوليك ١,٥ ملغ

### الخواص:

يعتبر هذا المستحضر الأمثل لمعالجة حالات فقر الدم الناجمة عن عوز الحديد وكذلك عوز فيتامين ب١٢ وحمض الفوليك نظراً لتركيبته المتميزة ولتحملة الهضمي الجيد، وندرة حدوث تصبغ الأسنان في حال تمديد الجرعة المعطاة وتفريش الأسنان بعد كل استخدام وبالتالي يوصف بشكل فعال لعلاج حالات فقر الدم بسبب العوز عند كل الأعمار.

### الاستطبايات:

- للمعالجة والوقاية من فقر الدم بعوز الحديد وخاصة في حالات نقصان الوارد الغذائي، الحمل، الإرضاع، النزوف وخاصة الطمعية الغزيرة، العمليات الجراحية، الأطفال الرضع ومرحل النمو.

- فقر الدم نتيجة عوز حمض الفوليك وعوز فيتامين ب١٢.

### مضادات الاستطباب:

- حالات فقر الدم الأنحلالي بسبب وراثي أو مناعي.

- تراكم الحديد في الجسم (هيموسيدرية).

- التحسس لأي من مكونات المستحضر.

### التأثيرات الجانبية:

قد تحدث بعض التأثيرات الجانبية عند بعض المرضى نتيجة تناول مستحضرات الحديد مثل: الغثيان، الإقياء، الإسهال والتي تختف أو تزول عند تناوله مع الطعام أو إيقاف استعماله، قد يتلون البراز باللون الأسود أثناء تناول هذا المستحضر.

### التحذيرات:

يجب الانتباه عند تناوله في حال وجود قرحات هضمية.

### التداخلات الدوائية:

يجب أن لا يعطى بالتزامن مع مركبات التتراساكلين، مضادات الحموضة.

### الجرعة وطريقة الاستعمال:

تحدد الجرعة بالاعتماد على توصيات الطبيب وحالة المريض، ومن الأفضل أن يعطى الدواء أثناء أو بعد تناول الطعام.

- الرضع: نصف ملعقة (٢,٥ مل) من ٣-١ مرات يومياً.

- الأطفال: ملعقة واحدة (٥ مل) من ٣-١ مرات يومياً.

- البالغين: ملعقتان (١٠ مل) من ٣-١ مرات يومياً.

### العبوة:

علبة كرتونية تحوي عبوة زجاجية سعة ١٢٥ مل.

علبة كرتونية تحوي عبوة زجاجية سعة ٢٠٠ مل.

### الحفظ:

يحفظ بدرجة حرارة ١٥-٢٥°م.

PK0070/02

TPP1301462	إن هذا دواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.	
- اتبع بدقة توصية الطبيب وطريقة الاستعمال المتضمن عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.	
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.	
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من إلقاء ظمئك.	
- لا تقم بوقف الدواء بغير وصفة طبية.	
- احتفظ بالدواء بعيداً عن متناول الأطفال.	
(الصيدلاني مجلس زوداء الصحة العرب والجمعاء الصيدلاني العرب)	

التراميدكا للصناعات الدوائية، صيدنايا - دمشق - سورية  
هاتف: +963 11 5955339 - فاكس: +963 11 5975174  
www.ultra-medica.net - ultramed@scs-net.org - بريد الكتروني:

ع الحراسة

5/6/13

R.S